


О РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К ФАРМАКОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИИ

Ю.П. СИВОЛАП

**Первый Московский государственный
медицинский университет
им. И.М. Сеченова**

Аддиктивные болезни с протоколами специфической терапии



- **F10** Алкоголизм
- **F11** Опиоидная зависимость
- **F17** Табакокурение




Этапы лечения в наркологии

- Лечение синдрома отмены и его осложнений
- Противорецидивная (поддерживающая) терапия


Лечение острых алкогольных расстройств

- **Бензодиазепины** и другие агонисты ГАМК
- Адренергические средства
- **Тиамин** и другие витамины
- Электролиты (**ионы K^+ и Mg^{++}**)




Спорные вопросы лечения острых алкогольных расстройств

- Показания к назначению нейролептиков
- Назначение и характер инфузионной терапии
- Целесообразность применения ноотропных и нейрометаболических средств



Противорецидивная (поддерживающая) терапия алкоголизма


- **Дисульфирам**
- **Акампросат**
- **Налтрексон**
- Селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина
- **Психотерапия**



Возможные перспективные средства лечения алкоголизма

- Баклофен
- Гамма-гидроксибутират
- Ноцицептин-орфанин FQ


Лечение опиоидной зависимости



- **Лиганды опиоидных рецепторов**
(агонисты; частичные агонисты; агонисты-антагонисты; антагонисты)
- **Симптоматические средства**
(альфа-2-адреномиметики; метоклопрамид; нестероидные противовоспалительные средства)

Методы опиоидной детоксикации

- **Кратковременная заместительная терапия**
- Клонидин-налоксоновая детоксикация
- Сверхбыстрая (ультрараapidная) детоксикация
- **Психотерапия**
- **Биологическая терапия**



Противорецидивная (поддерживающая) терапия опиоидной зависимости

- Психотерапия и другие виды нелекарственной поддержки
- Лечение налтрексоном
- **Поддерживающая заместительная терапия**
- **Психофармакотерапия**

Рецидивы в течение первого года лечения




- Не менее 75 % больных алкоголизмом [Miller W.R. et al., 2003]
- 75-80 % курильщиков табака [Daley D.C., 2005]
- До 97 % лиц с опиоидной зависимостью [Catalano R., 1988]



Цели лечения в наркологии


- **Полное прекращение употребления любых психоактивных веществ (ПАВ)**
- Уменьшение частоты употребления и дозы, замена вещества на менее опасное, выбор менее опасных путей введения, **смягчение аддиктивной болезни**

Особенности российской наркологии (1)



- Идеалистический характер
- Противоречие здравому смыслу
- Несоответствие стандартам ВОЗ
- Обособление от мирового профессионального наркологического сообщества

Особенности российской наркологии (2)




- Игнорирование данных современных научных исследований
- Низкий уровень большинства научных исследований и публикаций
- Неудовлетворительное качество образовательных программ
- Недостаточные требования к квалификации специалистов

Особенности российской наркологии (3)

- Избыточное многообразие лечебных методик без подтверждения их эффективности и безопасности
- Чрезмерное применение клиренсовой детоксикации в лечении синдромов отмены ПАВ
- Психотерапия off-label

Особенности российской наркологии (4)

- Биологическая терапия
- Толерантное и даже благожелательное отношение к «непрозрачным» и небезопасным методам лечения
- Запрет на методы лечения, рекомендованные ВОЗ
- **Пренебрежение правами пациентов наркологической клиники**



Проблема злоупотребления ПАВ: российские аспекты

- Высокая доля наиболее опасных форм употребления ПАВ
- Нестерильное введение наркотиков как основной канал распространения ВИЧ
- Самые высокие среди развитых стран показатели смертности, связанной с употреблением ПАВ