



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

09.01.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку медикаментов для нужд института в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить в срок до 13 января 2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№ п/п	МНН	Торговое наименование	Функциональные, технические и качественные характеристики, лекарственная форма, дозировка, упаковка	Ед. изм.	Кол-во
1	Амисульприд	Солиан таблетки 200 мг № 30	Таблетки, 200 мг: 30 шт. белого или почти белого цвета, круглые, плоские, с делительной риской на одной стороне и гравировкой - на другой. Показания: острая и хроническая шизофрения, сопровождающаяся продуктивной (в т.ч. бред, галлюцинации, расстройства мышления) и/или негативной симптоматикой (в т.ч. аффективная уплощенность, потеря эмоциональных и социальных связей), в т.ч. у пациентов с преобладанием негативной симптоматики. Противопоказания: сопутствующие пролактинзависимые опухоли (в т.ч. пролактинома гипофиза, рак молочных желез); феохромоцитомы; почечная недостаточность тяжелой степени с КК<10 мл/мин (отсутствие клинического опыта); комбинированное применение с агонистами допаминовых рецепторов (в т.ч. каберголин, хинаголид), за исключением пациентов с болезнью Паркинсона; комбинированное применение с леводопой, амантадином, апоморфином, бромкриптином, энтакапоном, лизуридом, перголидом, пирибедилом, прамипексолом, ропинеролом, селегилином; комбинированное применение с препаратами, способными удлинять интервал QT и вызывать развитие нарушений ритма, включая потенциально опасную для жизни полиморфную желудочковую тахикардию типа "пируэт", такими как антиаритмические средства IA класса (хинидин, дизопирамид) и III класса (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), другие лекарственные препараты (бепридил, цизаприд, метадон, сультоприд, тиоридазин, дифеманила метилсульфат, эритромицин для в/в введения, спирамицин для в/в введения, мизоластин, винкамин для в/в введения, галофантрин, лумефантрин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, пентамидин);	уп	15

			детский возраст до 18 лет; период лактации (грудное вскармливание); врожденная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы или галактозы, дефицит лактазы; повышенная чувствительность к амисульприду и другим компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей, сухом месте при температуре ниже 25°C. Срок годности не менее 3 года.		
2	Арипипразол	Зилаксерта таблетки 10 мг №28	Таблетки, 10 мг: 28 шт. капсуловидные, слегка двояковыпуклые, светло-розового цвета с мраморностью и темными вкраплениями. Показания: лечение шизофрении; лечение маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа средней и тяжелой степени и профилактика нового маниакального эпизода у взрослых, у которых возникают преимущественно маниакальные эпизоды, которые поддаются лечению арипипразолом; в качестве дополнения к антидепрессивной терапии при большом депрессивном расстройстве. Противопоказания: повышенная чувствительность к арипипразолу или другим компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (т.к. в составе содержится лактоза); период грудного вскармливания; возраст до 18 лет. Хранение при температуре не выше 30 °С.		15
3	Арипипразол	Зилаксерта таблетки 15 мг №28	Таблетки 15 мг: 28 шт. круглые, слегка двояковыпуклые, с фаской, светло-желтого цвета с мраморностью и возможными темными вкраплениями. Показания: лечение шизофрении; лечение маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа средней и тяжелой степени и профилактика нового маниакального эпизода у взрослых, у которых возникают преимущественно маниакальные эпизоды, которые поддаются лечению арипипразолом; в качестве дополнения к антидепрессивной терапии при большом депрессивном расстройстве. Противопоказания: повышенная чувствительность к арипипразолу или другим компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (т.к. в составе содержится лактоза); период грудного вскармливания; возраст до 18 лет. Хранение при температуре не выше 30 °С.	уп	15

4	Галоперидол	Галоперидол-Рихтер раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 1 мл ампулы, № 5	<p>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/1 мл: амп. 5 шт. бесцветный или слегка желтоватый, прозрачный, без механических примесей. Показания: острые и хронические психозы, сопровождающиеся возбуждением, галлюцинаторными и бредовыми расстройствами, маниакальные состояния, психосоматические расстройства; расстройства поведения, изменения личности (параноидные, шизоидные и другие), синдром Жилиа де ля Туретта, как в детском возрасте, так и у взрослых; тики, хорея Геттингтона; длительно сохраняющаяся и неподдающаяся терапии рвота, в т.ч. связанная с противоопухолевой терапией, и икота; премедикация перед оперативным вмешательством.</p> <p>Противопоказания: тяжелое токсическое угнетение функции ЦНС, вызванное ксенобиотиками, комы различного генеза; заболевания ЦНС, сопровождающиеся пирамидными и экстрапирамидными расстройствами (болезнь Паркинсона); психотические расстройства, связанные с деменцией у пациентов пожилого возраста (раствор для в/м и в/в введения); беременность; период лактации; детский возраст до 3 лет (раствор для в/м и в/в введения); дети с массой тела до 60 кг (таблетки); дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (таблетки); повышенная чувствительность к производным бутирофенона; повышенная чувствительность к компонентам препарата.</p> <p>Хранение в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре 15-30°C. Срок годности не менее 5 лет.</p>	уп	300
5	Дроперидол	Дроперидол раствор для инъекций 2,5 мг/мл амп. 2 мл № 5	<p>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0.25% (5 мг/2 мл): амп. 10 шт. Показания: Хирургия: вводный наркоз, премедикация, потенцирование общей и регионарной анестезии; нейролептанальгезия (одновременно с фентанилом); обеспечение седативного эффекта, устранение рвоты и боли в послеоперационном периоде, рвоты и тошноты во время хирургических и диагностических манипуляций; Терапия: шок и боль при травмах, тяжелые приступы стенокардии, инфаркт миокарда, гипертонический криз, отек легких; Психиатрическая практика: галлюцинации, психомоторное возбуждение.</p> <p>Противопоказания: Кома; Экстрапирамидные нарушения; Увеличение интервала QT на ЭКГ; Тяжелая депрессия; Гипокалиемия; Кесарево сечение; Артериальная гипотензия; Возраст до 2 лет; Гиперчувствительность к компонентам препарата и производным морфина. Хранение в защищенном от света, сухом, недоступном для детей месте при температуре до 20°C. Срок годности не менее 5 лет.</p>	уп	20

6	Кветиапин	Кетилепт таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг № 60	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг: 60 шт. белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой буквы "E" и числа "202" на одной стороне, без или почти без запаха. Показания: острые и хронические психозы, включая шизофрению; лечение маниакальных эпизодов в структуре биполярного расстройства; лечение депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести в структуре биполярного расстройства. Противопоказания: беременность; период лактации (грудное вскармливание); детский возраст; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.	уп	100
7	Кветиапин	Кетилепт таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 60	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг: 60 шт. темно-розового цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой буквы "E" и числа "204" на одной стороне, без или почти без запаха. Показания: острые и хронические психозы, включая шизофрению; лечение маниакальных эпизодов в структуре биполярного расстройства; лечение депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести в структуре биполярного расстройства. Противопоказания: беременность; период лактации (грудное вскармливание); детский возраст; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.	уп	60
8	Кветиапин	Сероквель таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг № 60	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг: 60 шт. Розового цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой. Показания: лечение острых и хронических психозов, включая шизофрению; лечение маниакальных эпизодов в структуре биполярного расстройства; лечение депрессивных эпизодов от средней до выраженной степени тяжести в структуре биполярного расстройства (в течение 8 недель). Противопоказания: совместное применение с ингибиторами цитохрома P450 (противогрибковые препараты группы азолов, эритромицин, кларитромицин, нефазодон, ингибиторы протеаз); повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Условия хранения: При температуре не выше 30 °C. Срок годности не менее 3 года.	уп	30

9	Оланзапин	Эголанза таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28	<p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг: 28 шт. желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой "E 404" на одной стороне, без или почти без запаха. Показания: лечение шизофрении; поддерживающая и длительная противорецидивная терапия у пациентов с шизофренией, ответивших на исходное лечение; лечение маниакального эпизода средней и тяжелой степени; предотвращение рецидивов у пациентов с биполярным расстройством, у которых препарат оказался эффективен при лечении маниакального эпизода; в комбинации с флуоксетином для лечения терапевтически резистентной депрессии у взрослых пациентов (большие депрессивные эпизоды при наличии в анамнезе неэффективного применения двух антидепрессантов по дозе и продолжительности курса терапии соответствующих данному эпизоду). Препарат в качестве монотерапии не показан для лечения терапевтически резистентной депрессии; в комбинации с флуоксетином для лечения депрессивного эпизода в структуре биполярного расстройства. Препарат в качестве монотерапии не показан для лечения депрессивного эпизода в структуре биполярного расстройства.</p> <p>Противопоказания: риск развития закрытоугольной глаукомы; детский и подростковый возраст до 18 лет; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.</p>	уп	70
10	Оланзапин	Эголанза таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг № 28	<p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг: 28 шт. желтого цвета, продолговатые, двояковыпуклые, с риской на одной стороне и гравировкой "E 402" - на другой, без или почти без запаха. Показания: лечение шизофрении; поддерживающая и длительная противорецидивная терапия у пациентов с шизофренией, ответивших на исходное лечение; лечение маниакального эпизода средней и тяжелой степени; предотвращение рецидивов у пациентов с биполярным расстройством, у которых препарат оказался эффективен при лечении маниакального эпизода; в комбинации с флуоксетином для лечения терапевтически резистентной депрессии у взрослых пациентов (большие депрессивные эпизоды при наличии в анамнезе неэффективного применения двух антидепрессантов по дозе и продолжительности курса терапии соответствующих данному эпизоду). Препарат в качестве монотерапии не показан для лечения терапевтически резистентной депрессии; в комбинации с флуоксетином для лечения депрессивного эпизода в структуре биполярного расстройства. Препарат в качестве монотерапии не показан для лечения депрессивного эпизода в структуре биполярного расстройства. Противопоказания: риск развития закрытоугольной глаукомы; детский и подростковый возраст до 18 лет; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу); повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей месте при температуре не</p>	уп	90

			выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.		
11	Рisperидон	Рилептид таблетки покрытые оболочкой 2 мг № 20	<p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг: 20 шт. желтого цвета, продолговатые, двояковыпуклые, с гравировкой "E752" на одной стороне и с риской - на другой, без или почти без запаха; с помощью риски таблетки можно разделить на две равные дозы.</p> <p>Показания: лечение шизофрении у взрослых и детей от 13 лет; лечение маниакальных эпизодов, связанных с биполярным расстройством, средней и тяжелой степени у взрослых и детей от 10 лет; краткосрочное (до 6 недель) симптоматическое лечение непрекращающейся агрессии в структуре расстройства поведения у детей от 5 лет с умственной отсталостью, диагностированной в соответствии с DSM-IV, при которой в силу тяжести агрессии или иного деструктивного поведения требуется медикаментозное лечение. Фармакотерапия должна быть частью более широкой программы лечения, в т.ч. психологических и образовательных мероприятий. Рисперидон должен назначаться специалистом в области детской неврологии и детской психиатрии или врачом, хорошо знакомым с лечением расстройств поведения у детей и подростков. Противопоказания: Хранение в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.</p>	уп	200
12	Рisperидон	Торендо таблетки покрытые пленочной оболочкой 4 мг № 20	<p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг: 20 шт. светло-зеленого цвета, овальные, двояковыпуклые, с риской на одной стороне; на поперечном разрезе - шероховатые, белого цвета. Показания: острая и хроническая шизофрения и другие психотические состояния с продуктивной и/или негативной симптоматикой; аффективные расстройства при различных психических заболеваниях; поведенческие расстройства у пациентов с деменцией при проявлении симптомов агрессивности (вспышки гнева, физическое насилие), при нарушениях психической деятельности (возбуждение, бред) или психотических симптомах; в качестве вспомогательной терапии при лечении маний при биполярных расстройствах; в качестве вспомогательной терапии расстройств поведения у подростков с 15 лет и взрослых пациентов со сниженным интеллектуальным уровнем или задержкой умственного развития, в случаях, если деструктивное поведение (агрессивность, импульсивность, аутоагрессия) является ведущим в клинической картине заболевания. Противопоказания: период лактации; детский и подростковый возраст до 15 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Список Б. Хранение в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности не менее 3 года.</p>	уп	20

13	Сульпирид	Эглонил таблетки 200 мг № 12	<p>Таблетки 200 мг: 12 шт. белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с риской с одной стороны, гравировкой "SLP200" с другой стороны и фаской с двух сторон. Показания: В качестве монотерапии или в сочетании с другими психотропными препаратами: острая и хроническая шизофрения; острые делириозные состояния; депрессии различной этиологии; неврозы и беспокойство у взрослых пациентов, при неэффективности обычных методов лечения (только для капсул 50 мг); тяжелые нарушения поведения (ажитация, членовредительство, стереотипия) у детей в возрасте старше 6 лет, в особенности в сочетании с синдромами аутизма (только для капсул 50 мг). Противопоказания: пролактин-зависимые опухоли (например, пролактиномы гипофиза и рак молочной железы); гиперпролактинемия; острая интоксикация этанолом, снотворными средствами, опиоидными анальгетиками; аффективные расстройства, агрессивное поведение, маниакальный психоз; феохромоцитома; период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет (для таблеток и раствора для в/м введения); детский возраст до 6 лет (для капсул); в комбинации с сультопридом, агонистами допаминергических рецепторов (амантадин, апоморфин, бромокриптин, каберголин, энтакапон, лизурид, перголид, пирибедил, прамипексол, кинаголид, ропинирол); повышенная чувствительность к сульпириду или другому ингредиенту препарата. В связи с наличием в составе препарата лактозы, он противопоказан при врожденной галактоземии, синдроме мальабсорбции глюкозы/галактозы или дефиците лактазы. Список Б. Хранение при температуре не выше 30°C в недоступном для детей месте. Срок годности не менее 3 года.</p>	уп	30
14	Тиаприд	Тиапридал таблетки 100 мг № 20	<p>Таблетки 100 мг: 20 шт. белого или кремовато-белого цвета, круглые, плоские, со скошенными с обеих сторон краями, с крестообразной риской на одной стороне и гравировкой "T100" - на другой; без запаха или со слабым запахом. Показания: Для взрослых: купирование психомоторного возбуждения и агрессивных состояний, особенно при хроническом алкоголизме или в пожилом возрасте; интенсивный хронический болевой синдром. Для взрослых и детей старше 6 лет: различные типы хореи; синдром Жиля де ла Туретта. Для детей старше 6 лет: расстройства поведения с ажитацией и агрессивностью. Противопоказания: диагностированные или подозреваемые пролактин-зависимые опухоли, например, пролактинома гипофиза и рак молочной железы; диагностированная или подозреваемая феохромоцитома; гипертензивный криз; выраженная почечная и/или печеночная недостаточность; I триместр беременности; период лактации (грудного вскармливания); детский возраст (до 6 лет); комбинация с сультопридом; комбинации с агонистами допаминовых рецепторов (амантадин, апоморфин, бромокриптин, каберголин, энтакапон, лизурид, перголид, пирибедил, прамипексол, кинаголид, ропинирол), за исключением больных, страдающих болезнью Паркинсона; комбинации с лекарственными</p>	уп	80

			<p>средствами, которые могут вызывать аритмии: антиаритмические препараты класса I A (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид) и класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), некоторые нейролептики (тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, циамемазин, амисульприд, сульпирид, пимозид, галоперидол, дроперидол), а также со следующими препаратами: леводопа, бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин, мизоластин, винкамин (в/в), спарфлоксацин, моксифлоксацин; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 5 лет.</p>		
15	Тиаприд	<p>Тиапридал раствор для внутривенного и внутримышечно го введения 50 мг/мл амп. 2 мл № 12</p>	<p>р-р д/в/в и в/м введения 100 мг/2 мл: амп. 12 шт. бесцветный или практически бесцветный, прозрачный. Показания: купирование психомоторного возбуждения и агрессивных состояний, особенно при хроническом алкоголизме или в пожилом возрасте; интенсивный хронический болевой синдром. Противопоказания: диагностированные или подозреваемые пролактин-зависимые опухоли, например, пролактинома гипофиза и рак молочной железы; диагностированная или подозреваемая феохромоцитома; гипертензивный криз; выраженная почечная и/или печеночная недостаточность; I триместр беременности; период лактации (грудного вскармливания); детский возраст (до 6 лет); комбинация с сультопридом; комбинации с агонистами допаминовых рецепторов (амантадин, апоморфин, бромокриптин, каберголин, энтакапон, лизурид, перголид, пирибедил, прамипексол, хинаголид, ропинирол), за исключением больных, страдающих болезнью Паркинсона; комбинации с лекарственными средствами, которые могут вызывать аритмии: антиаритмические препараты класса I A (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид) и класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), некоторые нейролептики (тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, циамемазин, амисульприд, сульпирид, пимозид, галоперидол, дроперидол), а также со следующими препаратами: леводопа, бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин, мизоластин, винкамин (в/в), спарфлоксацин, моксифлоксацин; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хранение в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года</p>	уп	30

16	Хлорпротиксен	Труксал таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 50	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг: 50 шт. темно-коричневого цвета, овальные, двояковыпуклые. Показания: Психозы и психотические состояния, сопровождающиеся беспокойством, страхом, психомоторным возбуждением, агрессивностью, в т.ч. при депрессивно-параноидной, циркулярной шизофрении, при простой вялотекущей шизофрении с психопатоподобной и неврозоподобной симптоматикой и при других психических заболеваниях; дисциркуляторная энцефалопатия, черепно-мозговые травмы (в составе комбинированной терапии), алкогольный делирий; нарушения сна при соматических заболеваниях; необходимость длительной терапии состояния возбуждения и тревоги, психосоматические, невротические и поведенческие расстройства у детей; судорожный кашель, спастические состояния в ЖКТ; премедикация; дерматозы, сопровождающиеся упорным зудом; аллергические реакции. Противопоказания: Угнетение ЦНС, в т.ч. при интоксикации алкоголем, барбитуратами и другими лекарственными средствами, оказывающими угнетающее влияние на ЦНС, патологические изменения картины крови, миелодепрессия, беременность, лактация, повышенная чувствительность к хлорпротиксену. Список Б. При температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.	уп	70
17	Хлорпротиксен	Хлорпротиксен таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг № 30	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг: 30 шт. оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые; вид на изломе - ядро от белого до почти белого цвета. Показания: психозы, включая шизофрению и маниакальные состояния, протекающие с психомоторным возбуждением, агитацией и тревогой; абстинентный синдром при алкоголизме и наркоманиях; гиперактивность, раздражительность, возбуждение, спутанность сознания у пожилых пациентов; нарушения поведения у детей; депрессивные состояния, неврозы, психосоматические расстройства; бессонница; боли (в комбинации с анальгетиками). Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к фенотиазинам). Угнетение центральной нервной системы (ЦНС) любого происхождения (в том числе вызванное приемом алкоголя, барбитуратов или опиатов), коматозные состояния, сосудистый коллапс, патологические изменения крови, угнетение костного мозга, феохромоцитомы, такие наследственные заболевания, как непереносимость лактозы или фруктозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы (в связи с наличием в составе лактозы и сахарозы), детский возраст до 6 лет. Условия хранения: при температуре не выше 25 °С. Срок годности 3 года.	уп	120
18	Миртазапин	Каликста таблетки покрытые пленочной оболочкой 15 мг № 30	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг: 30 шт. желтого цвета, продолговатые, с риской на одной стороне. Показания: Депрессия. Противопоказания: повышенная чувствительность к миртазапину или к какому-либо из вспомогательных веществ; больным с такими редкими наследственными проблемами, как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция, препарат	уп	20

			назначать не следует; применение препарата для лечения детей до 18 лет не рекомендуется.		
19	Оланзапин	Заласта Ку-таб таблетки диспергируемые в полости рта 5 мг бл. № 28	Таблетки диспергируемые в полости рта 5 мг: 28 шт. препарат показан для лечения шизофрении. Эффективно поддерживает улучшение клинической симптоматики при длительном лечении у пациентов с исходной положительной реакцией на препарат. Препарат показан для лечения умеренных или тяжелых эпизодов мании. У пациентов с маниакальными эпизодами при хорошем эффекте терапии оланзапином препарат показан для профилактики рецидивов мании при биполярном расстройстве. Противопоказания: повышенная чувствительность к оланзапину или другим компонентам препарата; закрытоугольная глаукома; детский возраст до 18 лет; период лактации. Хранение при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 5 лет.	уп	5

Заместитель директора по ОВ

А. В. Лыженков