



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

192019, г. Санкт – Петербург,  
ул. Бехтерева, д. 3  
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953  
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01  
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

20.01.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку медикаментов для нужд учреждения в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить в срок до 27.01.2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№	МНН	Характеристика товара	Единица изм.	Количество
1.	Фосфолипиды	Состав и форма выпуска: Раствор для в/в введения , дозировка: 250 мг/5мл 5 мл, фасовка: №5, В состав одной ампулы должны входить: фосфатидилхолин из соевых бобов высушенной субстанции, содержащей 93% (3-sn-фосфатидил) холина (синонимы - эссенциальные фосфолипиды, EPL <sup>®</sup> ) не менее 250мг, Вспомогательные вещества: дезоксихолевая кислота - 126.5 мг, натрия гидроксид - 13.4 мг, спирт бензиловый - 45 мг, натрия хлорид - 12 мг, рибофлавин - 0.5 мг, вода д/и - до 5 мл. показания к применению: жировая дегенерация печени (в т.ч. при сахарном диабете); острые и хронические гепатиты; цирроз печени;некроз клеток печени; печеночная кома и прекома; токсические поражения печени; токсикоз беременности; пред- и послеоперационное лечение, особенно при операциях в области гепатобилиарной зоны; псориаз; радиационный синдром.	уп	70
2.	Лактулоза	Состав и форма выпуска: Сироп, дозировка: 667 мг/мл 500 мл, фасовка: №1, в состав 100мл препарата должны входить: лактулоза 66,7г, Вспомогательные вещества: вода очищенная - до 100 мл, ароматизатор сливовый - 1.5 г. показания к применению: запор: регуляция физиологического ритма опорожнения толстой кишки;размягчение стула в медицинских целях (при геморрое, состоянии после операции на толстой кишке и в области анального отверстия);печеночная энцефалопатия: лечение и профилактика печеночной комы или прекомы.	уп	40
3.	Лоперамид	Состав и форма выпуска: Капсулы, дозировка: 2 мг, фасовка: №10, показания к применению: диарея (острая и хроническая различного генеза: аллергического, эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания). регуляция стула у пациентов с илеостомой. в качестве вспомогательного лс - диарея	уп	20

		инфекционного генеза.		
4.	Омепразол	Состав и форма выпуска: Капсулы 20мг; блистеры по 10 капсул, в пачке картонной три блистера. Условия хранения: Список Б.: В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Срок годности: 3 года	уп	20
5.	Метоклопрамид	Состав и форма выпуска: Таблетки, дозировка: 10 мг, фасовка: №50 В состав одной таблетки должны входить: метоклопрамида гидрохлорида моногидрат 10,54 мг, Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы моногидрат, желатин, магния стеарат, кремния диоксид осажденный показания к применению: рвота и тошнота различного генеза; атония и гипотония желудка и кишечника (в частности, послеоперационная); дискинезия желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагит, функциональный стеноз привратника; для усиления перистальтики при проведении рентгеноконтрастных исследований желудочно-кишечного тракта; парез желудка при сахарном диабете; в качестве средства, облегчающего дуоденальное зондирование (для ускорения опорожнения желудка и продвижения пищи по тонкой кишке). Срок годности 5 лет.	уп	15
6.	Метоклопрамид	Состав и форма выпуска: Раствор для в/в и в/м введения, дозировка: 10 мг/2 мл, фасовка: №10, в состав одной ампулы должны входить: метоклопрамида гидрохлорид 10мг, Вспомогательные вещества: натрия сульфит, динатрия ЭДТА, натрия хлорид, вода д/и. Показания к применению: рвота и тошнота различного генеза; атония и гипотония желудка и кишечника (в частности, послеоперационная); дискинезия желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагит, функциональный стеноз привратника; для усиления перистальтики при проведении рентгеноконтрастных исследований желудочно-кишечного тракта; парез желудка при сахарном диабете; в качестве средства, облегчающего дуоденальное зондирование (для ускорения опорожнения желудка и продвижения пищи по тонкой кишке). Срок годности 5 лет	уп	10
7.	Нифуроксазид	Состав и форма выпуска: Капсулы, дозировка: 200 мг, фасовка: №28, показания к применению: острая бактериальная диарея.	уп	20
8.	Фуросемид	Состав и форма выпуска: Раствор для в/в и в/м введения, дозировка: 2 мл, фасовка: №10, показания к применению: Отечный синдром различного генеза (сердечный, печеночный, почечный после второго месяца беременности, интоксикационный), отек легких и мозга, артериальная гипертензия, форсированный диурез, почечная недостаточность.	уп	50
9.	Термопсиса ланцетного трава+Натрия гидрокарбонат	Состав и форма выпуска: таблетки, дозировка: 6.7 мг+250 мг, фасовка: №20, показания к применению: кашель (различного генеза) у взрослых и детей старше 2 лет.	уп	50

10.	Амоксициллин+Клавулановая кислота	Состав и форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой, дозировка: 625мг(500мг+125мг), фасовка: №15, показания к применению: Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами: инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов (в т.ч. острый и хронический синусит, острый и хронический средний отит, заглоточный абсцесс, тонзиллит, фарингит); инфекции нижних отделов дыхательных путей (в т.ч. острый бронхит с бактериальной суперинфекцией, хронический бронхит, пневмония); инфекции мочевыводящих путей; гинекологические инфекции; инфекции кожи и мягких тканей, включая укусы человека и животных; инфекции костной и соединительной ткани; инфекции желчных путей (холецистит, холангит); одонтогенные инфекции.	уп	10
11.	Глицерол+Мяты перечной масло+Сульфаниламид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалиптовое масло	Состав и форма выпуска: аэрозоль для местного применения, дозировка: 30 мл, фасовка: №1, показания к применению: Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный стоматит.	уп	30
12.	Йод	Состав и форма выпуска: Раствор для наружного применения спиртовой, дозировка: 5% 10мл, фасовка: №1, показания к применению: Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии. Для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени. Для приема внутрь: профилактика и лечение атеросклероза, третичный сифилис.	уп	60
13.	Метронидазол	Состав и форма выпуска: Раствор для внутривенного введения, 1 мл раствора должен содержать метронидазол 5 мг, натрия хлорид, лимонную кислоту (моногидрат), натрия гидрофосфат безводный, воду д/и.; флакон должен быть полиэтиленовый по 100мл, в картонной пачке один флакон. Условия хранения: Список Б.: В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Срок годности препарата должен быть не менее трех лет	уп	50
14.	Водорода пероксид	Состав и форма выпуска: раствор для местного и наружного применения, дозировка: 3% 100 мл, флакон должен быть полиэтиленовый с насадкой, фасовка: флакон полиэтиленовый №1, показания к применению: для промываний и полосканий при стоматитах, ангинах, гинекологических заболеваниях; небольшие поверхностные раны, мелкие капиллярные кровотечения из поверхностных ран, носовые кровотечения.	уп	50
15.	Стрептомицин	Состав и форма выпуска: порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, дозировка: 1 г, фасовка: №50, показания к применению: туберкулез различной локализации, в т.ч. туберкулезный менингит (в составе комбинированной терапии); венерическая гранулема; туляремия, бруцеллез, чума; бактериальный эндокардит (только в сочетании с бензилпенициллином или с ванкомицином); острые бактериальные кишечные инфекции, инфекции мочевыводящих путей (после установления чувствительности возбудителя).	уп	2

16.	Сульфацетамид	Состав и форма выпуска: Капли глазные 20%, в тубик -капельницах по 1,5 мл, в пачке картонной две тубик-капельницы. Условия хранения: Список Б, В прохладном, защищенном от света месте, при температуре 8–15 °С.Срок годности: 2 года	уп	30
17.	Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт	Состав и форма выпуска: таблетки для рассасывания , Фасовка №24, в состав одной таблетки должны входить: амилметакрезол 600 мкг, 2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2мг, Показания: инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки. Срок годности: 3 года	уп	30
18.	Цефтриаксон	Состав и форма выпуска: Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения, дозировка: 1 г, фасовка: №1, показания к применению: Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции органов брюшной полости (перитонит, воспалительные заболевания ЖКТ, желчевыводящих путей, в т.ч. холангит, эмпиема желчного пузыря); заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей (в т.ч. пневмония, абсцесс легких, эмпиема плевры); инфекции костей и суставов; инфекции кожи и мягких тканей; инфекции мочевыводящих путей (в т.ч. пиелонефрит); бактериальный менингит; эндокардит; сепсис; гонорея; сифилис; мягкий шанкр; болезнь Лайма (боррелиоз); брюшной тиф; сальмонеллез и сальмонеллоносительство; инфицированные раны и ожоги.Профилактика послеоперационной инфекции.Инфекционные заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом.	уп	150
19.	Ципрофлоксацин	Состав и форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, дозировка: 500 мг, фасовка: №10, показания к применению: инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами, в т.ч. заболевания дыхательных путей, брюшной полости и органов малого таза, костей, суставов, кожи; септицемия; тяжелые инфекции лор-органов. лечение послеоперационных инфекций.профилактика и лечение инфекций у больных со сниженным иммунитетом.для местного применения: острые и подострые конъюнктивиты, блефароконъюнктивиты, блефариты, бактериальные язвы роговицы, кератиты, кератоконъюнктивиты, хронические дакриоциститы, мейбомиты. инфекционные поражения глаз после травм или попадания инородных тел. предоперационная профилактика в офтальмохирургии.	уп	10
20.	Вальпроевая кислота	Состав и форма выпуска: Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, одна таблетка должна содержать вальпроат натрия не менее 199,8мг,вальпроевой кислоты не менее 87мг, метилгидроксипропилцеллюлоза 6 мПа.с не менее 4,8мг,макрогол 6000 не менее 4,8мг, тальк не менее 4,8мг, титана диоксид не менее 0,8мг, 30% дисперсия полиакрилатане менее 16мг, при выражении в сухом экстракте не менее 4,8мг,кремния диоксид коллоидный гидратированный не менее 32,4мг, сахаринат натрия не менее 6,0мг, этилцеллюлоза не менее 7,2мг, метилгидроксипропилцеллюлоза 4000 мПа.с не менее 105,6мг, таблетки -100 штук- в полипропиленовом флаконе Срок годности - 3 года. показания к применению: У взрослых в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:— лечение генерализованных эпилептических приступов (клонические, тонические, тонико-	уп	30

		клонические, абсансы, миоклонические, атонические);— синдром Леннокса-Гасто;— лечение парциальных эпилептических припадков (парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее);— лечение и профилактика биполярных аффективных расстройств. У детей в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:— лечение генерализованных эпилептических приступов (клонические, тонические, тонико-клонические, абсансы, миоклонические, атонические);— синдром Леннокса-Гасто;— лечение парциальных эпилептических припадков (парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее).		
21.	Вальпроевая кислота	<p>Состав и форма выпуска: Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1 таблетка содержит : натрия вальпроат 333 мг+ вальпроевая кислота 145мг, метилгидроксипропилцеллюлоза 6 мПа.с не менее 7,2мг,макрогол 6000 не менее 7,2мг, тальк не менее 7,2мг, титана диоксид не менее1,2мг, 30% дисперсия полиакрилатане менее 24мг, при выражении в сухом экстракте не менее 7,2мг,кремния диоксид коллоидный гидратированный не менее 50мг, сахаринат натрия не менее 10,0мг, этилцеллюлоза не менее 12мг, метилгидроксипропилцеллюлоза 4000 мПа.с не менее 176,00мг , таблетки -30 штук- в полипропиленовом флаконе,</p> <p>Условия хранения: Препарат следует хранить в защитной упаковке в сухом месте при температуре до 25°С. Срок годности - 3 года.</p> <p>показания к применению: У взрослых в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:— лечение генерализованных эпилептических приступов (клонические, тонические, тонико-клонические, абсансы, миоклонические, атонические);— синдром Леннокса-Гасто;— лечение парциальных эпилептических припадков (парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее);— лечение и профилактика биполярных аффективных расстройств. У детей в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:— лечение генерализованных эпилептических приступов (клонические, тонические, тонико-клонические, абсансы, миоклонические, атонические);— синдром Леннокса-Гасто;— лечение парциальных эпилептических припадков (парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее).</p>	уп	30
22.	Вальпроевая кислота	<p>Состав и форма выпуска: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, В состав одной таблетки должны входить: натрия вальпроат 300 мг, вспомогательные вещества: повидон К-90 (поливидон К-90), кальция силиката гидрат, тальк, магния стеарат. В состав оболочкидолжны входить: сополимер метакриловой кислоты и метакрилата (1:1), тальк, Орасргу белый типа К1-7000 (титана диоксид, гипролоза), целлацефат (целлюлозы ацетатфталат), диэтилфталат; фасовка: №100, показания к применению:</p> <p>Эпилептические припадки: генерализованные, очаговые (фокальные, парциальные) с простой и сложной симптоматикой, малые.</p> <p>Судорожный синдром при органических заболеваниях мозга.</p> <p>Расстройства поведения, связанные с эпилепсией. Маниакально-депрессивный психоз с биполярным течением, не поддающийся лечению препаратами лития или другими лекарственными средствами. Фебрильные судороги у детей, детский тик.</p>	уп	30

23.	Леветирацетам	Состав и форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 1000мг Фасовка №30, в состав одной таблетки должны входить: леветирацетам 1000мг, Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный 12 мг, кроскармеллоза натрия 40 мг, кальция стеарат 12 мг, маннитол 80.8 мг, повидон 25.2 мг, целлюлоза микрокристаллическая 70 мг. Состав пленочной оболочки: Опадрай II синий 20 мг, в том числе: поливиниловый спирт 16 мг, макрогол 8.08 мг, тальк 5.92 мг, титана диоксид 8.2 мг, алюминиевый лак на основе красителя индигокармин 1.72 мг, алюминиевый лак на основе красителя красный очаровательный 0.08 мг.	уп	50
24.	Леветирацетам	Состав и форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 500мг Фасовка №30, в состав одной таблетки должны входить: леветирацетам 500мг, Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный 6 мг, кроскармеллоза натрия 20 мг, кальция стеарат 6 мг, маннитол 40.4 мг, повидон 12.6 мг, целлюлоза микрокристаллическая 35 мг. Состав пленочной оболочки: Опадрай II синий 20 мг, в том числе: поливиниловый спирт 8 мг, макрогол 4.04 мг, тальк 2.96 мг, титана диоксид 4.1 мг, алюминиевый лак на основе красителя индигокармин 0.86 мг, алюминиевый лак на основе красителя красный очаровательный 0.04 мг.	уп	70
25.	Ламотриджин	Состав и форма выпуска: таблетки 50мг Фасовка №30, в состав одной таблетки должны входить: ламотриджин 50 мг; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 97,5 мг, целлюлоза микрокристаллическая 12 мг, краситель железа оксид желтый 0,5 мг, повидон-К30 2,5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 3 мг, магния стеарат 1,5 мг, тальк 2 мг, кремния диоксид коллоидный 1 мг. Показаниями к применению должны быть у взрослых: простые парциальные судорожные припадки; сложные парциальные судорожные припадки; вторично генерализованные тонико-клонические судорожные припадки; первично генерализованные тонико-клонические судорожные припадки; абсансы типичные; абсансы атипичные; миоклонические припадки; припадки, резистентные к другим противосудорожным средствам любого типа. Применяют также в качестве вспомогательной терапии для детей в возрасте от 2 до 12 лет	уп	100
26.	Топирамат	Состав и форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 25мг №30, в состав одной таблетки должны входить: топирамат не менее 25мг, вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, лактоза, кросповидон, кремния диоксид коллоидный, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, в состав оболочки должны входить: гипромеллоза, макрогол, глицерол, тальк, титана диоксид, краситель железа оксид красный, лактоза; Показания к применению :В качестве монотерапии - впервые диагностированная эпилепсия. В качестве вспомогательного лекарственного средства у взрослых и детей старше 3 лет - парциальные или генерализованные тонико-клонические припадки; эпилептические припадки на фоне синдрома Леннокса-Гасто	уп	20

27.	Топирамат	Состав и форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 50мг №30, в состав одной таблетки должны входить: топирамат не менее 50мг, вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, лактоза, кросповидон, кремния диоксид коллоидный, кроскармелоза натрия, магния стеарат, в состав оболочки должны входить: гипромелоза, макрогол, глицерол, тальк, титана диоксид, краситель железа оксид красный, лактоза; Показания к применению :В качестве монотерапии - впервые диагностированная эпилепсия. В качестве вспомогательного лекарственного средства у взрослых и детей старше 3 лет - парциальные или генерализованные тонико-клонические припадки; эпилептические припадки на фоне синдрома Леннокса-Гасто	уп	25
28.	Топирамат	Состав и форма выпуска: таблетки покрытые пленочной оболочкой 100мг №30, в состав одной таблетки должны входить: топирамат не менее 100мг, вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, лактоза, кросповидон, кремния диоксид коллоидный, кроскармелоза натрия, магния стеарат, в состав оболочки должны входить: гипромелоза, макрогол, глицерол, тальк, титана диоксид, краситель железа оксид красный, лактоза; Показания к применению :В качестве монотерапии - впервые диагностированная эпилепсия. В качестве вспомогательного лекарственного средства у взрослых и детей старше 3 лет - парциальные или генерализованные тонико-клонические припадки; эпилептические припадки на фоне синдрома Леннокса-Гасто	уп	3
29.	Карбамазепин	Состав и форма выпуска: Таблетки, 1 таблетка содержит карбамазепина не менее 200мг, вспомогательные вещества: желатин не менее 10,5мг; магния стеарат не менее 3мг; МКЦ не менее 60мг; кроскармеллоза натрия не менее 6мг; таблетки по 10штук в блистере, в пачке картонной пять блистеров; Условия хранения: Список Б.: При температуре до 30 °С. Срок годности – 3 года	уп	350
30.	Карбамазепин	Состав и форма выпуска: Таблетки пролонгированного действия, 1 таблетка содержит карбамазепина 200мг, вспомогательные вещества: аммония метакрилата сополимер тип В (содержит сорбиновую кислоту и натрия гидроксид); глицерола триацетат; тальк; метакриловой кислоты — этилакрилата сополимер (содержит натрия лаурил сульфат и полисорбат 80); МКЦ; кросповидон; кремния оксид коллоидный безводный; магния стеарат; таблетки 10штук в блистере, в пачке картонной пять блистеров; Условия хранения: Список Б.: При температуре не выше 30 °С. Срок годности – 3 года	уп	40
31.	Карбамазепин	Состав и форма выпуска: Таблетки пролонгированного действия, 1 таблетка содержит карбамазепина 400мг, вспомогательные вещества: аммония метакрилата сополимер тип В (содержит сорбиновую кислоту и натрия гидроксид); глицерола триацетат; тальк; метакриловой кислоты — этилакрилата сополимер (содержит натрия лаурил сульфат и полисорбат 80); МКЦ; кросповидон; кремния оксид коллоидный безводный; магния стеарат; таблетки 10штук в блистере, в пачке картонной пять блистеров; Условия хранения: Список Б.: При температуре не выше 30 °С. Срок годности – 3 года	уп	60

32.	Бензобарбитал	Состав и форма выпуска: Таблетки, 1 таблетка содержит бензобарбитала 100мг ,в упаковке контурной ячейковой по 10 таблеток; в картонной коробке пять блистеров. Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Срок годности: 4 года.	уп	100
33.	Вальпроевая кислота	Состав и форма выпуска: Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1 таблетка должна содержать : натрия вальпроат 333 мг+ вальпроевая кислота 145мг, вспомогательными веществами должны быть: кремния диоксид коллоидный; гидроксипропилметилцеллюлоза; этилцеллюлоза; кремния диоксида гидрат; натрия сахаринат; глицерин; титана диоксид; полиэтиленгликоль 1500; тальк; Эудрагит Е100; Эудрагит NE30D, таблетки -10 штук в блистере, в упаковке не менее трех блистеров, Условия хранения: Препарат следует хранить в защитной упаковке в сухом месте при температуре до 30°С. Срок годности - 3 года.	уп	300
34.	Вальпроевая кислота	Состав и форма выпуска: Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1 таблетка должна содержать : натрия вальпроат 200 мг+ вальпроевая кислота 87мг, вспомогательными веществами должны быть: кремния диоксид коллоидный, гидроксипропилметилцеллюлоза, этилцеллюлоза, кремния диоксида гидрат, натрия сахарин, глицерин, титана диоксид, эвдрагит Е-100, эвдрагит NE-30D, полиэтиленгликоль 1500, тальк., таблетки -10 штук в блистере, в упаковке не менее трех блистеров, Условия хранения: Препарат следует хранить в защитной упаковке в сухом месте при температуре до 30°С. Срок годности - 3 года.	уп	60
35.	Прегабалин	Состав и форма выпуска: Капсулы , 1 капсула содержит прегабалина не менее 75мг; Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 8.25 мг, крахмал кукурузный - 15.75 мг, тальк - 1 мг.Состав крышечки желатиновой капсулы: титана диоксид - 1%, краситель железа оксид желтый - 1.2%, краситель железа оксид красный - 0.32%, краситель железа оксид черный - 0.1%, желатин - до 100%. Состав корпуса желатиновой капсулы: титана диоксид - 1%, краситель железа оксид желтый - 1.2%, краситель железа оксид красный - 0.32%, краситель железа оксид черный - 0.1%, желатин - до 100%,в контурной ячейковой упаковке 56 капсул. В картонной каробке четыре блистера.Условия хранения: Список Б.: При температуре до 25 °С.. Срок годности: не менее двух лет Показания: Нейропатическая боль: лечение нейропатической боли у взрослых.Эпилепсия: в качестве дополнительной терапии у взрослых с парциальными судорожными приступами, сопровождающимися или не сопровождающимися вторичной генерализацией. Генерализованное тревожное расстройство: лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых.Фибромиалгия: лечение фибромиалгии у взрослых.Средство не должно быть противопоказано женщинам во время беременности и грудного вскармливания	уп	25
36.	Атропин	Состав и форма выпуска: Раствор для инъекций, дозировка: 0,1% 1 мл, фасовка: №5, показания к применению: Системное применение: спазм гладкомышечных органов ЖКТ, желчных протоков, бронхов; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, гиперсаливация (паркинсонизм, отравление солями тяжелых металлов, при стоматологических вмешательствах),	уп	60



		синдром раздраженной толстой кишки, кишечная колика, почечная колика, бронхит с гиперсекрецией, бронхоспазм, ларингоспазм (профилактика); премедикация перед хирургическими операциями; АВ-блокада, брадикардия; отравления м-холиномиметиками и антихолинэстеразными веществами (обратимого и необратимого действия); рентгенологическое исследование ЖКТ (при необходимости уменьшения тонуса желудка и кишечника).		
37.	Неостигмина метилсульфат	Состав и форма выпуска :Раствор для внутривенного и подкожного введения, дозировка: 0,05% фасовка ампулы по 1мл №10.	уп	20
38.	Расторопши пятнистой плодов экстракт	Состав и форма выпуска: Драже, 1 драже содержит расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (эквивалент силимарина) 35мг + Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 55.38 мг, крахмал пшеничный - 55.38 мг, повидон (колидон 25) - 1.65 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 67 мг, магния стеарат - 2.5 мг, тальк - 7 мг, декстрозы моногидрат - 20.6 мг, сорбитол - 4.13 мг, натрия гидрокарбонат - 1.36 мг.Состав оболочки: целлацефат - 0.84 мг, диэтилфталат - 0.6 мг, сахароза - 162.19 мг, акации камедь - 1.562 мг, желатин - 0.86 мг, тальк - 26.718 мг, титана диоксид - 4.82 мг, макрогол (ПЭГ 6000) - 0.13 мг, краситель Браун Опалюкс (сахароза, железа оксид красный, железа оксид черный, метил- и пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная) - 2.25 мг, глицерол - 0.03 мг. , в блистере 10 драже; в пачке картонной 8 блистеров. Условия хранения: Список Б.: При температуре не выше 25 °С. Срок годности: 2 года	уп	50
39.	Ацетазоламид	Состав и форма выпуска: Таблетки, 1 таблетка содержит ацетазоламида 250мг; в контурной ячейковой упаковке 10 таблеток; в пачке картонной 3 упаковки. Условия хранения: Список Б.: В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С..Срок годности: 5 лет.	уп	30

Заместитель директора по ОБ

А. В. Лыженков