



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

09.01.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку медикаментов для нужд учреждения в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить в срок до 13.01.2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№ п/п	МНН	Функциональные, технические и качественные характеристики, лекарственная форма, дозировка, упаковка	Ед.изм.	Кол-во
1	Алимемазин	таб., покр. пленочной обол., 5 мг: 50 шт. темно-розового цвета, с выдавленным символом на одной стороне и полоской на другой. Активное вещество: алимемазина тартрат 5мг. Вспомогательные вещества: сахар молочный (лактоза); кремния диоксид коллоидный; сахар рафинированный (сахароза); крахмал пшеничный; тапиока (крахмал тапиоки); тальк; магния стеарат. Оболочка пленочная: гипромеллоза; макрогол 6000; титана диоксид; краситель Оспрей R110 розовый; тальк. Показания: невроты и невротоподобные состояния эндогенного и органического генеза с преобладанием сенестопатических, ипохондрических, фобических и психовегетативных расстройств; психопатии с астеническими и психоастеническими расстройствами; тревожно-депрессивные состояния в рамках пограничных эндогенных и сосудистых заболеваний; сенестопатические депрессии; соматизированные психические расстройства; состояния волнения и тревоги при соматических заболеваниях; нарушения сна различного генеза; аллергические реакции (симптоматическое лечение). Противопоказания: закрытоугольная глаукома; гиперплазия предстательной железы; тяжелые заболевания печени; тяжелые заболевания почек; паркинсонизм; миастения; синдром Рейе; одновременное применение ингибиторов МАО; беременность; период грудного вскармливания; детский возраст до 7 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года.	уп	100

2	Палиперидон	таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 3 мг: 28 шт. белого цвета, капсуловидной формы, с надписью "PAL 3"; выпускные отверстия могут быть видимы или невидимы при визуальном осмотре. Активное вещество: палиперидон 3мг. Вспомогательные вещества: макрогол 200К - 81.43 мг, макрогол 7000К - 73.7 мг, натрия хлорид - 30 мг, повидон (К29-32) - 10 мг, гиэтиллоза - 10.45 мг, стеариновая кислота - 0.75 мг, бутилгидрокситолуол - 0.11 мг, железа оксид красный - 1 мг, железа оксид желтый - 0.03 мг, макрогол 3350 - 1 мг, целлюлозы ацетат (398-10) - 44.55 мг, краситель белый (гипромеллоза, титана диоксид, лактозы моногидрат, триацетин) - 33 мг, карнаубский воск - 0.03 мг. Показания: шизофрения, в т.ч. в фазе обострения у взрослых; профилактика обострений шизофрении у взрослых; лечение шизофрении у подростков в возрасте от 12 до 17 лет; терапия шизоаффективных расстройств: в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с антидепрессантами и/или нормотимиками у взрослых. Противопоказания: повышенная чувствительность к палиперидону, рisperидону, а также к любому вспомогательному ингредиенту препарата. Препарат следует хранить при температуре от 15° до 30°С в недоступном для детей месте. Срок годности - 2 года.	уп	5
3	Палиперидон	таблетки пролонгир. действия, покр. оболочкой, 6 мг: 28шт. светло-оранжевого цвета (допускается слабый коричневатый оттенок), капсуловидной формы, с надписью "PAL 6"; выпускные отверстия могут быть видимы или невидимы при визуальном осмотре. Активное вещество: палиперидон 6 мг. Вспомогательные вещества: макрогол 200К - 78.45 мг, макрогол 7000К - 73.7 мг, натрия хлорид - 30 мг, повидон (К29-32) - 10 мг, гиэтиллоза - 10.45 мг, стеариновая кислота - 0.75 мг, бутилгидрокситолуол - 0.11 мг, железа оксид красный - 1.01 мг, макрогол 3350 - 1 мг, целлюлозы ацетат (398-10) - 44.55 мг, краситель бежевый (гипромеллоза, титана диоксид, полиэтиленгликоль 400, железа оксид желтый, железа оксид красный) - 18 мг, карнаубский воск - 0.03 мг. Показания к применению: шизофрения, в т.ч. в фазе обострения у взрослых; профилактика обострений шизофрении у взрослых; лечение шизофрении у подростков в возрасте от 12 до 17 лет; терапия шизоаффективных расстройств: в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с антидепрессантами и/или нормотимиками у взрослых. Противопоказания: повышенная чувствительность к палиперидону, рisperидону, а также к любому вспомогательному ингредиенту препарата. Препарат следует хранить при температуре от 15° до 30°С в недоступном для детей месте. Срок годности - 2 года.	уп	15
4	Палиперидон	таблетки пролонгир. действия, покр. оболочкой, 9 мг: 28шт. розового цвета (допускается сероватый оттенок), капсуловидной формы, с надписью "PAL 9"; выпускные отверстия могут быть видимы или невидимы при визуальном осмотре. Активное вещество: палиперидон 9 мг. Вспомогательные вещества: макрогол 200К - 75.45 мг, макрогол 7000К - 73.7 мг, натрия хлорид - 30 мг, повидон (К29-32) - 10 мг, гиэтиллоза - 10.45 мг, стеариновая кислота - 0.75 мг, бутилгидрокситолуол - 0.11 мг, железа	уп	6

		<p>оксид черный - 0.01 мг, железа оксид красный - 1 мг, макрогол 3350 - 1 мг, целлюлозы ацетат (398-10) - 44.55 мг, краситель розовый (гипромеллоза, титана диоксид, полиэтиленгликоль 400, железа оксид красный) - 15 мг, карнаубский воск - 0.03 мг. Показания к применению: шизофрения, в т.ч. в фазе обострения у взрослых; профилактика обострений шизофрении у взрослых; лечение шизофрении у подростков в возрасте от 12 до 17 лет; терапия шизоаффективных расстройств: в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с антидепрессантами и/или нормотимиками у взрослых. Противопоказания: повышенная чувствительность к палиперидону, рisperидону, а также к любому вспомогательному ингредиенту препарата. Препарат следует хранить при температуре от 15° до 30°C. Срок годности - 2 года.</p>		
5	Палиперидон	<p>сусп. д/в/м введения пролонгир. действия 100 мг/1 мл: шприц 1 шт. в компл. с иглами д/и (2 шт.) белого или почти белого цвета, свободная от посторонних включений. Активное вещество: палиперидона пальмитат 156мг что соответствует содержанию палиперидона 100мг. Вспомогательные вещества: полисорбат 20 - 12 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 30 мг, лимонной кислоты моногидрат - 5 мг, натрия гидрофосфат - 5 мг, натрия дигидрофосфата моногидрат - 2.5 мг, натрия гидроксид - 2.84 мг, вода д/и - до 1 мл. 1 мл - шприцы из циклолефинового сополимера, снабженные ограничителем обратного хода поршня (1) в комплекте с иглами д/в/м/и (2 шт. - в дельтовидную и ягодичную мышцу). Показания: лечение шизофрении; профилактика рецидивов шизофрении. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; повышенная чувствительность к рisperидону (т.к. палиперидон является активным метаболитом рisperидона). Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности - 2 года</p>	уп	2
6	Палиперидон	<p>сусп. д/в/м введения пролонгир. действия 150 мг/1.5 мл: шприц 1 шт. в компл. с иглами д/и (2 шт.) белого или почти белого цвета, свободная от посторонних включений. Активное вещество: палиперидона пальмитат 156мг что соответствует содержанию палиперидона 100мг. спомогательные вещества: полисорбат 20 - 12 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 30 мг, лимонной кислоты моногидрат - 5 мг, натрия гидрофосфат - 5 мг, натрия дигидрофосфата моногидрат - 2.5 мг, натрия гидроксид - 2.84 мг, вода д/и - до 1 мл. 1.5 мл - шприцы из циклолефинового сополимера, снабженные ограничителем обратного хода поршня (1) в комплекте с иглами д/в/м/и (2 шт. - в дельтовидную и ягодичную мышцу). Показания: лечение шизофрении; Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; повышенная чувствительность к рisperидону (т.к. палиперидон является активным метаболитом рisperидона). профилактика рецидивов шизофрении. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности - 2 года.</p>	уп	2

7	Хлорпромазин	<p>таб., покрытые пленочной оболочкой, 100 мг: 10 шт. от красновато-коричневого до коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета. Активное вещество: хлорпромазина гидрохлорид 100мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 82.6 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 140 мг, лактозы моногидрат - 60 мг, коповидон - 1.4 мг, кроскармеллоза натрия - 12 мг, магния стеарат - 4 мг.</p> <p>Состав пленочной оболочки: Опадрай II 85F25509 - 16 мг, в т. ч. спирт поливиниловый частично гидролизованный - 40%, макрогол-3350 - 20.2%, тальк - 14.8%, краситель железа оксид красный - 20.2%, краситель железа оксид черный - 4%, краситель железа оксид желтый - 0.8%.</p> <p>Показания: хронические параноидные и галлюцинаторно-параноидные состояния; состояния психомоторного возбуждения у больных шизофренией (галлюцинаторно-бредовый, гебефренический, кататонический синдромы); алкогольный психоз, маниакальное возбуждение у больных маниакально-депрессивным психозом; психические расстройства у больных эпилепсией; ажитированная депрессия у больных пресенильным, маниакально-депрессивным психозом; невротические заболевания, сопровождающиеся повышением мышечного тонуса; боли, в т.ч. каузалгии (в сочетании с анальгетиками); нарушения сна стойкого характера (в сочетании со снотворными и транквилизаторами); болезнь Меньера; рвота беременных; лечение и профилактика рвоты при лечении противоопухолевыми средствами и при проведении лучевой терапии; зудящие дерматозы; в составе "литических смесей" в анестезиологии.</p> <p>Противопоказания: заболевания печени и почек, сердечно-сосудистая декомпенсация, выраженная гипотония, нарушение функции желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °С. Срок годности - 2 года.</p>	уп	50
8	Хлорпромазин	<p>таб., покрытые пленочной оболочкой, 25 мг: 10 шт. белого с желтоватым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета. Активное вещество: хлорпромазина гидрохлорид 25мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 20.65 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 35 мг, лактозы моногидрат - 15 мг, коповидон - 0.35 мг, кроскармеллоза натрия - 3 мг, магния стеарат - 1 мг.</p> <p>Состав пленочной оболочки: Опадрай II 85F38209 - 4 мг, в т. ч. спирт поливиниловый частично гидролизованный - 40%, макрогол-3350 - 20.2%, тальк - 14.8%, титана диоксид - 24.89%, краситель железа оксид желтый - 0.11%. Показания: хронические параноидные и галлюцинаторно-параноидные состояния; состояния психомоторного возбуждения у больных шизофренией (галлюцинаторно-бредовый, гебефренический, кататонический синдромы); алкогольный психоз, маниакальное возбуждение у больных маниакально-депрессивным психозом; психические расстройства у</p>	уп	150

		<p>больных эпилепсией;ажитированная депрессия у больных пресенильным, маниакально-депрессивным психозом; невротические заболевания, сопровождающиеся повышением мышечного тонуса; боли, в т.ч. каузалгии (в сочетании с анальгетиками);нарушения сна стойкого характера (в сочетании со снотворными и транквилизаторами); болезнь Меньера;рвота беременных;лечение и профилактика рвоты при лечении противоопухолевыми средствами и при проведении лучевой терапии;зудящие дерматозы; в составе "литических смесей" в анестезиологии.</p> <p>Противопоказания: заболевания печени и почек, сердечно-сосудистая декомпенсация, выраженная гипотония, нарушение функции желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °С. Срок годности - 2 года.</p>		
9	Хлорпромазин	<p>таб., покрытые пленочной оболочкой, 50 мг: 10 шт. оранжево-розового цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета. Активное вещество: хлорпромазина гидрохлорид 50мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 41.3 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 70 мг, лактозы моногидрат - 30 мг, коповидон - 0.7 мг, кроскармеллоза натрия - 6 мг, магния стеарат - 2 мг.</p> <p>Состав пленочной оболочки: Опадрай II 85F240048 - 8 мг, в т. ч. спирт поливиниловый частично гидролизованный - 40%, макрогол-3350 - 20.2%, тальк - 14.8%, титана диоксид - 22.7%, краситель железа оксид красный - 1.3%, краситель железа оксид желтый - 0.8%, краситель железа оксид черный - 0.2%. Показания: хронические параноидные и галлюцинаторно-параноидные состояния; состояния психомоторного возбуждения у больных шизофренией (галлюцинаторно-бредовый, гебефренический, кататонический синдромы); алкогольный психоз, маниакальное возбуждение у больных маниакально-депрессивным психозом;психические расстройства у больных эпилепсией;ажитированная депрессия у больных пресенильным, маниакально-депрессивным психозом; невротические заболевания, сопровождающиеся повышением мышечного тонуса; боли, в т.ч. каузалгии (в сочетании с анальгетиками);нарушения сна стойкого характера (в сочетании со снотворными и транквилизаторами); болезнь Меньера;рвота беременных;лечение и профилактика рвоты при лечении противоопухолевыми средствами и при проведении лучевой терапии;зудящие дерматозы; в составе "литических смесей" в анестезиологии.</p> <p>Противопоказания: заболевания печени и почек, сердечно-сосудистая декомпенсация, выраженная гипотония, нарушение функции желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В защищенном от света месте, при температуре 15–25 °С. Срок годности - 2 года.</p>	уп	50
10	Клозапин	<p>таб. 100 мг: 50 шт. Активное вещество: клозапин 100мг. вспомогательные вещества: МКЦ — 101/110 мг; крахмал картофельный — 20,25/33,6 мг; повидон (поливинилпирролидон высокомолекулярный</p>	уп	50

		<p>медицинский) — 2,25/3,9 мг; кальция стеарат — 1,5/2,5 мг. Показания: Острые и хронические формы шизофрении, особенно резистентные к терапии другими антипсихотическими средствами (нейролептиками) и/или при непереносимости их побочных эффектов; психотические расстройства у детей старше 5 лет и подростков, различной этиологии. Противопоказания: Повышенная чувствительность к азалептину или любым другим компонентам препарата; гранулоцитопения или агранулоцитоз в анамнезе (за исключением развития гранулоцитопении или агранулоцитоза вследствие ранее применявшейся химиотерапии); нарушение функции костного мозга; алкогольный или другие токсические психозы, лекарственные интоксикации, коматозные состояния; беременность и период лактации; детский возраст (до 5 лет). Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Срок годности 5 лет.</p>		
11	Клозапин	<p>таб. 25 мг: 50 шт. Активное вещество: клозапин 25мг. вспомогательные вещества: МКЦ — 101/110 мг; крахмал картофельный — 20,25/33,6 мг; повидон (поливинилпирролидон высокомолекулярный медицинский) — 2,25/3,9 мг; кальция стеарат — 1,5/2,5 мг. Показания: Острые и хронические формы шизофрении, особенно резистентные к терапии другими антипсихотическими средствами (нейролептиками) и/или при непереносимости их побочных эффектов; психотические расстройства у детей старше 5 лет и подростков, различной этиологии. Противопоказания: Повышенная чувствительность к азалептину или любым другим компонентам препарата; гранулоцитопения или агранулоцитоз в анамнезе (за исключением развития гранулоцитопении или агранулоцитоза вследствие ранее применявшейся химиотерапии); нарушение функции костного мозга; алкогольный или другие токсические психозы, лекарственные интоксикации, коматозные состояния; беременность и период лактации; детский возраст (до 5 лет). Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Срок годности 5 лет.</p>	уп	80

Заместитель директора по ОБ

А. В. Лыженков